



FCO

FICHE PRATIQUE



Suite à plusieurs foyers de FCO BTV 8 et 4 depuis le mois dernier, tout le monde doit se tenir en alerte! Les ovins sont les plus touchés, mais les caprins et les bovins sont également concernés.

Maladie dite "vectorielle" qui se transmet d'une brebis infectée vers les autres animaux par un moucheron appelé "Culicoïdes".

Evolution population de Culicoïdes :

Les pics de population se situent à l'automne et au printemps, avec une période d'inactivité de 2-3 semaines en décembre. L'activité des mouchérons est la plus forte à la tombée du jour et à l'aube.



Symptômes :

Fièvre, troubles respiratoires, salivations, œdème de la face, langue bleue, avortements, amaigrissement, boiteries...jusqu'à de fort taux de mortalité

Protéger son troupeau et limiter les cas cliniques

VACCINATION

Afin de limiter propagation de la maladie, **vaccinez !** Le vaccin n'est pas vivant et il n'y a pas de temps d'attente.

EN PRIORITE :
animaux naïfs, sans symptômes, à proximité des foyers découverts.

ANTIPARASITAIRE EXTERNE

Une application de deltaméthrine à partir de la fin du mois de septembre est décisive ! En suspension aqueuse son efficacité contre les mouchérons est de 4 à 10-15 jours (délais d'attente variables selon le produit, référez vous à la notice)
Ne pas administrer en systématique tous les 15 jours, car l'innocuité d'une dose répétée n'a pas été prouvée.

CONDUITE GENERALE

- Veillez à ne pas avoir de points d'eau stagnante à proximité de la bergerie
- Hygiène et désinfection : un tas de fumier humide va contribuer à la multiplication du vecteur
- Si possible rentrer les animaux en fin de journée en bergerie
- Veillez au bon état sanitaire général de vos animaux (parasitisme, carences...). En fin de gestation l'organisme des brebis est fortement sollicité, pensez à contacter votre conseiller habituel pour faire un point sur la ration et la complémentation

En cas de suspicion
Contactez votre vétérinaire et le DDetsPP de votre département